

くすりのしおり

外用剤

2015年04月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：フッ化ナトリウム洗口液 0.1%「ビーブランド」

主成分：フッ化ナトリウム (Sodium fluoride)

剤形：淡青色澄明の液剤

シート記載：フッ化ナトリウム洗口液 0.1%「ビーブランド」、組成、効能・効果、250mL、医療用医薬品、使用方法、保管上の注意、洗口方法、洗口時の注意、使用期限、製造番号



この薬の作用と効果について

歯の耐酸性を増強し、再石灰化を促進して歯質を強化します。また、歯垢細菌の代謝活性抑制作用があります。通常、う蝕の予防に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は :医療担当者記入>>
- ・通常、1回フッ化ナトリウムとして0.05%～0.1%溶液（2倍に希釈するか、または原液のまま）を5～10mLを取り出し、1日1回食後または就寝前に洗口します。
<洗口方法>薬液を口に含み、約30秒間薬液が十分歯面にゆきわたるよう含み洗いします。次に薬液を十分に吐き出してください。いずれの場合も必ず指示された使用方法に従ってください。
洗口後30分間はうがいや飲食物をとらないようにしてください。
- ・齲蝕の予防（洗口）にのみ使用してください。
- ・飲み込まないように、よく指導してください。
- ・飲み込むおそれのある幼児には使用しないでください。
- ・誤って飲用し、嘔吐、腹痛、下痢などの急性中毒症状を起こした場合には、牛乳などのカルシウム剤を応急的に服用し、医師の診療を受けてください。
- ・使い忘れた場合は、気がついた時に洗口してください。ただし、次の洗口する時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回洗口してください。一度に2回分を使用しないでください。
- ・誤って多く使用した場合は歯科医師または薬剤師に相談してください。
- ・歯科医師の指示なしに、自分の判断で使用を止めないでください。

生活上の注意

- ・歯の形成期にあたる6歳未満の小児が繰り返し誤って飲用した場合、フッ化物の過量摂取により歯に白い斑点やしみなどの症状が現れる場合があります。

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、過敏症が報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

該当する記載事項はありません。

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

- ・乳幼児、小児の手の届かないところで、できるだけ清潔で涼しい所に、室温（1～30℃）で保管してください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。