

ミラノール顆粒11%使用説明書

本剤は歯科医師の指導により使用する医薬品であるため、歯科医師の指導を守り、正しくご使用ください。投薬及び使用に際しては以下の事項についても御留意ください。

洗口液の作り方

毎日法 (250ppm) : 1日1回、毎日洗口

- ①本剤1g(黄色包装)を水200mLに溶かす。
※容器はプラスチック製を使用して下さい。



毎日法 (450ppm) : 1日1回、毎日洗口

- ①本剤1.8g(ピンク色包装)を水200mLに溶かす。
※容器はプラスチック製を使用して下さい。



週1回法 (900ppm) : 1週間に1回洗口

- ①本剤1.8g(ピンク色包装)を水100mLに溶かす。


小中学校の集団应用の場合、例として、
50人までは5包を500mLの水に溶かす。
100人までは10包を1000mLの水に溶かす。



- ※容器はプラスチック製を使用して下さい。

洗口方法

- ①洗口のの前には、歯をみがくか、水で口すすぎをして下さい。
- ②歯科医師により指導を受けた液量を取り出して下さい。
(本剤の専用容器には計量カップがついていますので定められた液量を容易に取り出せます。)
- ③取り出した洗口液を口に含み約30秒間洗口液が歯面にゆきわたるように、口を閉じ頬を動かして含み洗い(ブクブクうがい)をして下さい。(洗口図参照)
- ④洗口は、嚥下を避ける目的で、下を向いて行って下さい。(洗口図参照)
- ⑤洗口後の液は十分に吐き出して下さい。
なお、取り出した洗口液の残液は捨てて下さい。
(残液で再度洗口したり、薬液をもとの容器にもどしたりしないで下さい。)
- ⑥洗口後30分間はうがいや飲食物をとらないようにして下さい。
- ⑦家庭での洗口は、毎日法を推奨します。
集団応用については未就学児では毎日法を、学齢期以上では週1回法及び毎日法を推奨します。



使用前の注意事項

- ①使用方法(洗口液の作り方、洗口方法)については歯科医師より指導を受けて下さい。
- ②使用に際しては間違いなく洗口できることを、水で練習させて確認して下さい。
- ③飲み込む恐れのある幼・小児には使用しないで下さい。

使用期間中の注意事項

- ①少なくとも年に1回の歯科健診は受けさせて下さい。
- ②本剤はそのままで劇薬に該当しますが、使用方法どおりに作った洗口液は普通薬の濃度となります。洗口液を作ったのち洗口させて下さい。
- ③幼・小児の家庭での洗口は、保護者の監督下で洗口させて下さい。
- ④**本剤は飲み薬ではありません。**使用方法(洗口液の作り方、洗口方法)に従って使用して下さい。
もし、飲み薬と間違い、袋に入った顆粒をそのまま飲んでしまった場合、嘔吐、腹痛、下痢などの症状があらわれることがあります。その場合は、応急的に牛乳、カルシウム剤を飲ませ医師の診断を受けさせて下さい。
- ⑤誤って週1回法の洗口液(900ppm溶液)で毎日洗口した場合は、速やかに歯科医師に相談して下さい。

保管上の注意事項

- ①本剤及びその洗口液は子供の手の届かない所に保管して下さい。
- ②洗口液は使用后すぐにフタを閉めて下さい。
- ③洗口液はできるだけ清潔でずしい所に保管して下さい。
もし、外部からの菌の侵入により、カビが生えた場合は、その洗口液を捨て容器をよく洗った後、新しく洗口液を作って下さい。

発売元



株式会社ビーブランド・メディコーデンタル
大阪市東淀川区西淡路5丁目20番19号
電話 (06) 6370-4182(代)

製造販売元



東洋製薬化成株式会社
大阪市鶴見区鶴見2丁目5番4号