

フッ化ナトリウム洗口液0.1%「ビーブランド」を使用される方へ

フッ化ナトリウム洗口液0.1%「ビーブランド」の使い方

——— 歯科医師のみなさまへ ———

安全にお使いいただくため、患者様の洗口に合わせた計量・希釈方法をお示しください。

洗口液の作り方

原液を使用する場合



薬剤を計量カップ
[]mLの
線まで入れて
洗口します。

保管上の注意

- ① 小児の手の届かないところに保管してください。
- ② 直射日光をさけ、室温(1℃~30℃)で保管してください。
- ③ 歯科医師の指示により使用してください。

液をうすめて使用する場合



① 薬剤を計量カップ
[]mLの
線まで入れます。

② 水を
[]mLの
線まで加えて
うすめた後
洗口します。

洗口方法 (1日1回食後または就寝前に行ってください。)

- ① 歯科医師の指導に従って洗口液を準備してください。
- ② 洗口前に、歯を磨くか水で口をすすいでください。
- ③ 準備した洗口液を口に含み、約30秒間液が歯面に行き渡るように、ブクブクと洗口してください。
※誤って飲み込まないように、下向き加減で洗口してください。



歯をよく磨き、
汚れを落とします。



うつぶいてブクブク
うがいを約30秒間
します。



液をはき出します。

- ④ 洗口後の液は十分に吐き出してください。
口は水ですすがず、1~2回溜まった唾液を吐き出してください。

洗口時の注意

● 小児の洗口は保護者等の方が見てあげてください ● 洗口液は、1回で口に含むようにし、カップに残った液は捨ててください ● 誤って飲用し、嘔吐、腹痛、下痢などの症状を起こした場合は牛乳やカルシウム剤を応急的に飲ませ、医師の診断を受けてください。